



Status for udvikling af SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC) i Danmark

Begrebet VOC dækker over SARS-CoV-2 varianter, der er vist at være mere smitsomme og/eller er vist at have nedsat følsomhed for antistoffer.

En Variant of Interest (VOI) er en virusvariant, der er under mistanke for enten at være mere smitsom og/eller have nedsat følsomhed for antistoffer.

Varianter fundet ved andre metoder end helgenomsekventering

Der bruges forskellige metoder i Danmark for, på hurtigere vis end ved helgenomsekventering, at kunne detektere de mutationer, som følges særligt tæt. SSI har d. 23. februar 2021 opstartet en udvidet form for deltaPCR-analyse, der udover at detektere deletion H69-70 også detekterer mutationen N501Y. Denne nye metode kan detektere, og skelne mellem, hvorvidt en prøve er positiv for B.1.351/P.1 eller B.1.1.7. Disse vil herefter kunne smitteopspores hurtigere, da denne undersøgelse kan udføres hurtigere end helgenomsekventering. [Læs mere om metoderne her.](#)

Per d. 11. marts er der ved andre metoder end helgenomsekventering identificeret 12 tilfælde som forventes at være B.1.351 eller P.1. Disse tilfælde undersøges efterfølgende ved helgenomsekventering og såfremt dette er muligt, vil de i tilfælde af fund af fuldt genom tælle med i nedenstående opgørelse af data fra helgenomsekventeringen.

Tabel 1. Antal tilfælde af VOC eller VOI (eksklusive B.1.1.7) i denne rapport fundet ved helgenomsekventering eller under mistanke ved andre metoder.

Variant eller mutation	Helgenomsekventerede tilfælde	Tilfælde under mistanke ved andre metoder
B.1.351	28	12
P.1	3	-
B.1.525	215	-
E484K*	30	-

* Inkluderer kun tilfælde hvor E484K-mutationen optræder uden samtidig at være en benævnt variant

Varianter fundet ved helgenomsekventering

Status for P.1

Der er i alt identificeret 3 tilfælde af P.1 i Danmark som er verificeret ved helgenomsekventering. Alle 3 tilfælde har haft relation til udenlandsrejse. [Læs mere om P.1. her.](#)

Status for B.1.351

Denne variant kan være både mere smitsom og have nedsat følsomhed for antistoffer. Der er ved helgenomsekventering per 11. marts 2021 i alt påvist 28 tilfælde med B.1.351 i Danmark, heraf 3 uden dansk CPR-nummer. De fordeler sig i alle fem regioner, dog med flest i Region Hovedstaden (9) og Region Syddanmark (8). Tilfældene er fundet i perioden 10. januar til 3. marts, og 11 af tilfældene har haft relation til udenlandsrejse.



Status for B.1.1.7

B.1.1.7 er indtil videre fundet blandt 8.396 personer i Danmark i perioden fra den 14. november 2020 til 6. marts 2021. Dette inkluderer også 13 tilfælde fundet som husstandskontakter til kendte smittede. For 200 af tilfældene har der været oplyst rejsehistorik fra 42 forskellige lande. Det er uvist om disse er smittet i udlandet eller i Danmark.

Samlet set er der fra uge 46 2020 til og med lørdag d. 6. marts i uge 9 2021 blevet sekventeret 61.430 prøver. Blandt disse havde 47.893 prøver et tilstrækkeligt genetisk materiale til, at der kunne bestemmes en virusvariant. Dette betyder, at B.1.1.7 er fundet i 30,2% af disse prøver.

Tabel 2. Antal bekræftede tilfælde, antal sekventerede prøver og påviste tilfælde med B.1.1.7 fra stikprøver, uge 46 2020 til lørdag d. 6. marts i uge 9 2021

Uge	Antal bekræftede tilfælde**	Sekventerede				B.1.1.7 identificeret i alt			
		I alt	Andel (%) af bekræftede	Med fund af fuldt genom	Andel (%) af bekræftede	Antal*	Andel af sekventerede (fuldt genom)	95% Konfidens-interval	
Uge 46	7.514	2.041	27,2%	1.444	19,2%	4	0,3%	0,1%	0,7%
Uge 47	8.427	2.224	26,4%	1.693	20,1%	3	0,2%	0,0%	0,5%
Uge 48	8.741	2.409	27,6%	1.777	20,3%	7	0,4%	0,2%	0,8%
Uge 49	12.755	3.161	24,8%	2.486	19,5%	10	0,4%	0,2%	0,7%
Uge 50	21.805	3.974	18,2%	3.005	13,8%	13	0,4%	0,2%	0,7%
Uge 51	24.427	5.418	22,2%	4.164	17,0%	35	0,8%	0,6%	1,2%
Uge 52	16.930	4.510	26,6%	3.608	21,3%	64	1,8%	1,4%	2,3%
Uge 53	14.535	4.892	33,7%	3.915	26,9%	80	2,0%	1,6%	2,5%
Uge 1	11.289	5.414	48,0%	4.158	36,8%	155	3,7%	3,2%	4,3%
Uge 2	6.988	5.361	76,7%	4.229	60,5%	299	7,1%	6,3%	7,9%
Uge 3	5.315	4.495	84,6%	3.685	69,3%	471	12,8%	11,7%	13,9%
Uge 4	3.611	3.409	94,4%	2.659	73,6%	518	19,5%	18,0%	21,0%
Uge 5	3.084	2.852	92,5%	2.234	72,4%	663	29,7%	27,8%	31,6%
Uge 6	2.707	2.425	89,6%	1.958	72,3%	922	47,1%	44,9%	49,3%
Uge 7	3.326	3.035	91,3%	2.406	72,3%	1.584	65,8%	63,9%	67,7%
Uge 8	3.667	3.328	90,8%	2.548	69,5%	1.950	76,5%	74,8%	78,2%
Uge 9***	3.243	2.482	76,5%	1.924	59,3%	1.618	84,1%	82,4%	85,7%
Samlet	158.364	61.430	38,8%	47.893	30,2%	8.396	17,5%	17,2%	17,9%

Note til tabel: Data opdateres bagudrettet efterhånden som sekventeringsdata indkommer.


* Inklusiv 13 tilfælde fundet som husstandskontakter til smittede.

** Inkluderer ligeledes personer uden kendt adresse.

*** Uge 9 indeholder data til og med lørdag d. 6. marts.



Figur 1. Andel af sekventerede prøver med B.1.1.7 med 95% konfidensintervaller, uge 46 2020 til uge 9 2021




Tabel 3. Antal bekræftede tilfælde med B.1.1.7 samt andel af sekventerede prøver fordelt på regioner for uge 8 og uge 9 2021

Region	B.1.1.7 tilfælde fordelt på region									
	Uge 8-2021					Uge 9-2021				
	Antal tilfælde	Antal prøver (fuldt genom)	Andel	95 % konfidens-interval		Antal tilfælde	Antal prøver (fuldt genom)	Andel	95 % konfindes-interval	
Hele landet*	1950	2548	76,5%	74,8%	78,2%	1618	1924	84,1%	82,4%	85,7%
Region Hovedstaden	947	1120	84,6%	82,3%	86,6%	756	870	86,9%	84,5%	89,1%
Region Sjælland	249	405	61,5%	56,5%	66,2%	248	307	80,8%	75,9%	85,0%
Region Syddanmark	512	623	82,2%	78,9%	85,1%	376	432	87,0%	83,5%	90,1%
Region Midtjylland	179	252	71,0%	65,0%	76,6%	165	215	76,7%	70,5%	82,2%
Region Nordjylland	44	122	36,1%	27,6%	45,3%	49	73	67,1%	55,1%	77,7%


* Tal for hele landet inkluderer personer uden kendt adresse.



Figur 2. Antal tilfælde med B.1.1.7 fra d. 14. november 2020 til d. 6. marts fordelt på region samt prøvedato.




Figur 3. Aldersfordeling i funktionelle aldersgrupper for bekræftede tilfælde med B.1.1.7 samt aldersfordeling for alle tilfælde af covid-19 fra 14. november 2020 til 6. marts 2021





Figur 4. Aldersfordeling i 10-års aldersgrupper for bekræftede tilfælde med B.1.1.7 samt aldersfordeling for alle tilfælde af covid-19 fra 14. november 2020 til 6. marts 2021




Opgørelse af E484K-mutationen

E484K-mutationen følges tæt, da der er bekymring for, at den kan medføre nedsat følsomhed for antistoffer. Denne mutation findes også i flere af de VOC, der også følges tæt såsom B.1.351, B.1.525 og P.1. E484K-mutationen er en substitution af Glutamat (E) med Lysin (K) på position 484 i det receptorbindende domæne på spikeproteinet.

Data for fund af E484K-mutationen vil løbende opdateres i denne rapport i takt med der kommer mere data og viden om den. Derfor vil dette afsnit også kunne ændres i takt med dette.

E484K-mutationen er indtil videre fundet i 276 tilfælde fra uge 46 2020. Dette tal inkluderer både B.1.525, B.1.351 og P.1. E484K-mutationen er i samme periode fundet i 30 tilfælde, hvor der ikke samtidig har været en af de mutationer, der gør tilfældene til en navngiven variant. Disse 30 tilfælde fordeler sig i alle regioner, dog flest tilfælde i Region Nordjylland (n=15).

Figur 5. Antal tilfælde med E484K-mutationen uden samtidig mutation der gør det til en navngiven variant fra d. 7. december 2020 til d. 3. marts fordelt på region samt prøvedato.





Opgørelse af B.1.525

I forbindelse med overvågning af E484K-mutationen er der fundet en ny kombination af mutationer hvor F888L, som er en substitution af Fenylalanine (F) til Leucin (L) i S2 domænet af spikeproteinet, er fundet i kombination med E484K-mutationen. Denne kombination er set i en stigende andel af tilfældene med E484K-mutationen, hvorfor der nu holdes særligt øje med denne. Kombinationen af disse to mutationer har fået variant-betegnelsen B.1.525.

Kombinationen er opdaget sideløbende i Danmark og England.

I Danmark er kombinationen indtil videre set i 215 tilfælde fra d. 14. januar til d. 6. marts.

Geografisk fordeler de sig med 60 i Region Hovedstaden, 121 i Region Syddanmark, 21 i Region Sjælland, 12 i Region Midtjylland og én uden kendt adresse.

Der er foreløbigt fund af 7 tilfælde med relation til rejseaktivitet i Nigeria.

Denne variant er også fundet i en række andre lande, primært England, Nigeria og USA.

Varianten betegnes indtil videre som en Variant of Interest (VOI) og altså endnu ikke som en Variant of Concern (VOC).

Figur 6. Antal tilfælde med B.1.525 fra d. 14. januar 2020 til d. 6. marts fordelt på region samt prøvedato.

