



Status for udvikling af SARS-CoV-2 Varianter der overvåges i Danmark

Introduktion

Denne rapport er baseret på data opgjort d. **25-06-2021** og udgivet d. **26-06-2021**.

Rapporten inkluderer overvågningsdata for følgende SARS-CoV-2 varianter og mutationer:

Lineages:

B.1.1.7 (Alpha) med mutation E484K

B.1.351 (Beta)

P.1 (Gamma)

B.1.617.2 (Delta)

Mutationer:

E484K

N501Y

VOC står for “variants of concern” og dækker over SARS-CoV-2 varianter, der er vist at være mere smitsomme og/eller er vist at have nedsat følsomhed for antistoffer.

VOI står for “variants of interest” og dækker over SARS-CoV-2 varianter der er under mistanke for at være mere smitsom og/eller have nedsat følsomhed for antistoffer.

P.1, B.1.351 og B.1.1.7 indeholder alle **mutationen N501Y** som har været kædet sammen med øget smitsomhed. P.1, B.1.351 og B.1.525 indeholder alle **mutationen E484K**, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer. Desuden er der blevet identificeret B.1.1.7 varianter der også indeholder mutation E484K. Virusvarianten B.1.617 indeholder **mutationen L452R** som er under mistanke for at medføre nedsat følsomhed for antistoffer.

Disse mutationer er placeret i den del af SARS-COV-2 genomet der koder for spike proteinet på overfladen af virus.

En uddybende beskrivelse af udvalgte SARS-CoV-2 varianter [kan findes her](#).

Metoder benyttet til detektering af SARS-CoV-2 varianter

I Danmark benyttes virus helgenomsekventering (også kaldet WGS) til at typebestemme SARS-CoV-2 varianter herunder VOC og VOI. Desuden benyttes en udvidet deltaPCR-analyse, der på hurtigere vis end helgenomsekventering, kan detektere de mutationer, som følges særligt tæt. Disse vil herefter kunne smitteopspores hurtigere. [Læs mere om metoden her](#). I det følgende rapporteres alene om varianter fundet ved helgenomsekventering.



Overblik over bekræftede tilfælde med udvalgte varianter

Tabellen herunder viser det totale antal tilfælde af VOC og VOI varianter fundet i Danmark ved brug af helgenomsekventering

VOC og VOI: WGS bekræftede tilfælde

Variant	Antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
P.1	51	1
B.1.1.7 + E484K	360	0
B.1.351	117	0
B.1.617.2	320	33
øvrige B.1.617	32	4
B.1.621	54	1

Status for P.1 (Gamma)


Variant P.1 har mutation **N501Y**, som har været kædet sammen med øget smitsomhed, og mutation **E484K**, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer. Varianten blev første gang detekteret i Danmark d. 26-02-2021, og der er indtil videre blevet identificeret **51 tilfælde** med helgenomsekventering.

Figuren herunder viser antal nye tilfælde opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor P.1 første gang blev detekteret i Danmark.



Variant P.1

Bekræftede tilfælde




Figuren herunder viser antal nye tilfælde af variant P.1 opgjort per dag for de seneste 4 uger.



Variant P.1

Bekræftede tilfælde de seneste 4 uger



Tabellen herunder viser den regionale fordeling af P.1. Personer uden registreret CPR nummer er ikke inkluderet i tabellen.

Regional fordeling af tilfælde med variant P.1

Region	Total antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
Hovedstaden	36	1
Sjælland	0	0
Syddanmark	6	0
Midtjylland	7	0
Nordjylland	0	0
Ukendt Region	1	0

Status for B.1.1.7 (Alpha) med mutation S:E484K


Variant B.1.1.7 har mutation N501Y, som har været kædet sammen med øget smitsomhed.

Variant B.1.1.7 har siden dens introduktion i Danmark d. 14. november 2020 udviklet sig til at blive



den dominerende variant i alle landets regioner. Denne variant har siden uge 10 (2021) udgjort over 90% af alle sekventerede SARS-CoV-2 positive prøver med fund af fuldt genom. Den 30-03-2021 blev det første tilfælde med B.1.1.7 med mutation E484K identificeret i Danmark. Da E484K mutationen muligvis medfører nedsat følsomhed for antistoffer følges denne variant tæt. Der er indtil videre fundet **360 tilfælde** af denne variant i Danmark.

Figuren herunder viser antal nye tilfælde opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor B.1.1.7+E484K første gang blev detekteret i Danmark.




Figuren herunder viser antal nye tilfælde af variant B.1.1.7+E484K opgjort per dag for de seneste 4 uger.



Variant B.1.1.7+E484K

Bekræftede tilfælde de seneste 4 uger



Tabellen herunder viser den regionale fordeling af B.1.1.7+E484K. Personer uden registreret CPR nummer er ikke inkluderet i denne tabel.

Regional fordeling af tilfælde med variant B.1.1.7 + E484K

Region	Total antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
Hovedstaden	301	0
Sjælland	28	0
Syddanmark	17	0
Midtjylland	2	0
Nordjylland	9	0
Ukendt Region	3	0




Status for B.1.351 (Beta)

Variant B.1.351 har mutation **N501Y**, som har været kædet sammen med øget smitsomhed, og mutation **E484K**, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer.

Varianten blev første gang detekteret i Danmark d. 10-01-2021, og der er indtil videre blevet identificeret **117 tilfælde** ved brug af helgenomsekventering.

Figuren herunder viser antal nye tilfælde opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor B.1.351 første gang blev detekteret i Danmark.




Figuren herunder viser antal nye tilfælde af variant B.1.351 opgjort per dag for de seneste 4 uger.



Variant B.1.351

Bekræftede tilfælde de seneste 4 uger



Tabellen herunder viser den regionale fordeling af B.1.351. Personer uden registreret CPR nummer er ikke inkluderet i tabellen.

Regional fordeling af tilfælde med variant B.1.351

Region	Total antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
Hovedstaden	55	0
Sjælland	3	0
Syddanmark	25	0
Midtjylland	18	0
Nordjylland	4	0
Ukendt Region	12	0



Status for B.1.617.2 (Delta)

Variant B.1.617 blev første gang blev påvist i oktober 2020 i Indien og er siden blevet yderligere opdelt i fire undertyper: B.1.1617, B.1.1617.1, B.1.1617.2 og B.1.1617.3. Disse varianter indeholder en **L452R** mutation i det receptorbindende domæne i spike proteinet, der er under mistanke for at medføre en nedsat følsomhed for antistoffer. Derudover indeholder undertypen B.1.617.2 mutationen **T478K**, og denne variant anses internationalt for at være en VOC og indgår derfor i den danske overvågning af varianter. B.1.1617.2 blev første gang detekteret i Danmark d. 02-04-2021, og der er indtil videre blevet identificeret **320 tilfælde** med helgenomsekventering.

Tabellen herunder viser antal nye tilfælde opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor B.1.617.2 første gang blev detekteret i Danmark.

B.1.617.2: Antal WGS bekræftede tilfælde og andel af sekventerede prøver fordelt på kalender uger

Uge	Antal tilfælde	Antal med genomdata	Andel af bekræftede (%)	Antal B.1.617.2	Andel af genomer (%)	Binomial 95% konfidens interval
2021-13	4402	3490	79,3%	3	0,1%	0%-0,3%
2021-14	4524	3452	76,3%	3	0,1%	0%-0,3%
2021-15	5053	3706	73,3%	5	0,1%	0%-0,3%
2021-16	4846	3624	74,8%	13	0,4%	0,2%-0,6%
2021-17	5457	4139	75,8%	16	0,4%	0,2%-0,6%
2021-18	6486	5004	77,2%	13	0,3%	0,1%-0,4%
2021-19	7226	5956	82,4%	30	0,5%	0,3%-0,7%
2021-20	6866	5370	78,2%	9	0,2%	0,1%-0,3%
2021-21	6696	5212	77,8%	14	0,3%	0,2%-0,5%
2021-22	5662	4563	80,6%	33	0,7%	0,5%-1%
2021-23	2810	2465	87,7%	66	2,7%	2,1%-3,4%
2021-24	1649	1343	81,4%	87	6,5%	5,2%-7,9%
2021-25	485	138	28,5%	28	20,3%	13,9%-28%
Total	62162	48462	78%	320	0,7%	0,6%-0,7%



herunder viser antal nye tilfælde i de seneste 2 uger fordelt på regioner.


B.1.617.2: Antal WGS bekræftede tilfælde og andel af sekventerede prøver fordelt på regioner

Region	Uge: 2021-23				Uge: 2021-24			
	Antal B.1.617.2	Antal prøver med genomdata	Andel af bekræftede (%)	Binomial 95% konfidens interval	Antal B.1.617.2	Antal prøver med genomdata	Andel af bekræftede (%)	Binomial 95% konfidens interval
Hovedstaden	34	1063	3,2%	2,2%-4,4%	60	655	9,2%	7,1%-11,6%
Sjælland	2	310	0,6%	0,1%-2,3%	8	174	4,6%	2%-8,9%
Syddanmark	11	271	4,1%	2%-7,1%	2	107	1,9%	0,2%-6,6%
Midtjylland	10	473	2,1%	1%-3,9%	8	242	3,3%	1,4%-6,4%
Nordjylland	7	335	2,1%	0,8%-4,3%	5	158	3,2%	1%-7,2%
Hele landet	66	2465	2,7%	2,1%-3,4%	87	1343	6,5%	5,2%-7,9%

Figuren nedenfor viser den ugentlige opgørelse over andelen af variant B.1.617.2 med tilhørende 95% konfidens interval blandt alle sekventerede prøver med tilgængeligt genomdata.

Lineage B.1.617.2

Andel af sekventerede prøver fordelt på kalender uger





Figuren herunder viser antal nye tilfælde fordelt på regioner. Nye tilfælde er opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor B.1.617.2 første gang blev detekteret i Danmark.

Variant B.1.617.2

Bekræftede tilfælde fordelt på regioner





Figuren herunder viser antal nye tilfælde af variant B.1.617.2 opgjort per dag for de seneste 4 uger.

Variant B.1.617.2

Bekræftede tilfælde de seneste 4 uger



Tabellen herunder viser den regionale fordeling af B.1.617.2. Personer uden registreret CPR nummer er ikke inkluderet i tabellen.

Regional fordeling af tilfælde med variant B.1.617.2

Region	Total antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
Hovedstaden	181	24
Sjælland	17	1
Syddanmark	48	1
Midtjylland	47	5
Nordjylland	18	1
Ukendt Region	9	1



Status for mutation E484K

Mutation E484K er under mistanke for at medføre nedsat følsomhed for antistoffer, og denne mutation er derfor en del af den danske SARS-COV-2 overvågning.


Mutationen findes i flere af de VOC/VOI'er, der også følges tæt såsom P.1, B.1.351, B.1.621, B.1.1.7 og B.1.525.

Tabellen herunder viser det totale antal tilfælde af varianter med mutation E484K fundet i Danmark ved brug af helgenomsekventering.

Mutation E484K: WGS bekræftede tilfælde

Variant	Antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
P.1	51	1
B.1.1.7	360	0
B.1.351	117	0
B.1.621	54	1
B.1.525	616	1
Andre	43	-1
Total	1241	2

Figuren herunder viser antal nye tilfælde opgjort ugevis fra den kalenderuge hvor mutation E484K første gang blev detekteret i Danmark.




Figuren herunder viser den procentvise fordeling af varianter med mutation E484K.



Mutation E484K

Procentvis fordeling



Status for mutation N501Y

Mutation N501Y har været kædet sammen med øget smitsomhed, og denne mutation er derfor en del af den danske SARS-COV-2 overvågning.

Mutationen findes i flere af de VOC/VOI'er, der også følges tæt såsom B.1.1.7, P.1, B.1.351 og B.1.621.



Tabellen herunder viser det totale antal tilfælde af varianter med mutation N501Y fundet i Danmark ved brug af helgenomsekventering.

Mutation N501Y: WGS bekræftede tilfælde

Variant	Antal bekræftede tilfælde	Ændring i antal tilfælde siden sidste rapport
B.1.1.7	65552	187
P.1	51	1
B.1.351	117	0
B.1.621	54	1
Andre	12	0
Total	65786	189